

Elaborado por: Dolores Añón
Revisado y aprobado por: Carmen Ramos
Fecha: Septiembre 2015

I. OBTENCION DE LA MUESTRA

Protocolo de recogida de heces para el estudio de Parásitos

Para asegurar la completa recuperación de los parásitos presentes en el organismo del paciente, se deben examinar tres muestras separadas por un determinado lapso de tiempo a fijar por el clínico.

Recogida de la muestra:

Realice una limpieza de su inodoro vertiendo agua desde su cisterna.

Colóquese en posición contraria a la que habitualmente hace sus heces (ver figura) para facilitar la recogida de las heces o en un recipiente tipo orinal o cuña. No es necesario que esté estéril pero si limpio. No contendrá restos de jabones, detergentes o desinfectantes.



Deposite directamente una porción de muestra de heces en un frasco estéril de boca ancha, si esto no es posible, use un recipiente limpio y seco. Evite que las heces se mezclen con orina, agua o papel higiénico.

Si el paciente lleva pañal, la muestra se puede recoger directamente del mismo, evitando restos de celulosa, mediante una cucharita limpia, seca y libre de residuos de detergentes.

Mantenga la muestra en un sitio fresco hasta su entrega en el laboratorio, que debe realizarse lo antes posible.

Notas:

- No es necesario realizar ningún tipo de dieta especial antes de realizar la prueba.
- Con el fin de realizar un correcto análisis se deben examinar tres muestras de heces recogidas en días diferentes.